




オテズラ錠を服用される 乾癬の患者さんへ



オテズラ錠を処方される乾癬患者さんの
服薬指導のためにご活用ください。

オテズラ錠は、服用開始から6日目以降は、 1回30mgを1日2回(朝・夕)服用します。

オテズラ錠は、食事の前でも後でも、どのタイミングで服用してもかまいませんので、決められた回数を毎日忘れずに服用してください。



オテズラ錠による症状改善

オテズラ錠で改善が期待できる症状

皮膚の症状(頭皮など)


爪の症状

かゆみ

手指や足指、かかとなどの腫れ、
痛み、関節の変形などの症状

オテズラ錠による症状の改善時期には**個人差**があります。患者さんによっては、**飲み始めから24週と、ゆっくり症状が改善**してくる場合があります。

オテズラ錠による症状改善のイメージ



症状の改善を維持するためには、毎日きちんと服用を続けることが大切です。ご自身の判断でお薬を飲むのをやめたり、お薬を飲む回数を減らしたりしないでください。

オテズラ錠の副作用

オテズラ錠は、飲み始めの頃に**吐き気や下痢、頭痛**などの副作用がみられることがあります。これらの症状は、あらわれてから2週間ほどでおさまることが多いですが、医師に相談をしたうえで、一時的にお薬を飲む回数を減らしたり、お薬を飲むのを中断することもあります。服用中に気になる変化があったら、すみやかに医師・薬剤師にご相談ください。

オテズラ錠以外のお薬を服用している場合

お薬の中には、オテズラ錠と一緒に飲むことで、オテズラ錠の効果が出にくくなるものがあります。乾癬以外で治療中の病気や服用中のお薬がある場合は、必ず医師または薬剤師にお伝えください。



その他、服用中に気になることがある場合

服用中に気になることや心配なことがあれば、すぐに医師・薬剤師にご相談ください。



オテズラ[®]錠を服用される患者さん向けの
情報サイトをご用意しております。



オテズラ[®]錠に関するお問い合わせは、
下記にてお受けしております。

アマジェン株式会社
メディカルインフォメーションセンター
TEL. 0120-790-549

受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日・会社休日を除く)

お問い合わせ内容を正確に聞き取るため、また回答の質の維持・向上のため、
当センターにおける受発信の通話を録音させていただいております。あらかじめ、
ご了承ください。

アマジェン株式会社

〒107-6239 東京都港区赤坂九丁目7番1号

OTZ201010RX1
2020年7月作成